

Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur - OVDAS



REGION	Los Ríos - Los Lagos		
REAV No.	328	Fecha - Hora	13/03/2012 16:00
Periodo Evaluado:	12 Marzo (15:00 HL)	13 Marzo (15:00 HL)	
Volcán	Puyehue-Cordón Caulle	GVP ID	1507-15
Alerta anterior	ROJA	Alerta actual	ROJA

1. OBSERVACIONES

1.1 Vigilancia volcánica:

1.1.1 Actividad sísmica : Durante las últimas 24 horas la actividad sísmica en el sistema volcánico presentó cinco (5) sismos VT, con magnitud de duración (Md) máxima de 0,9; y cuatro (4) sismos LP, con desplazamiento reducido (DR) máximo de 0,6 cm² y magnitud de duración (M_D) igual a 0,5.

No. Eventos/hr	Magnitud Max	Tremor (DRmax)
<1	0,9	0,8

Observaciones: - Los valores de desplazamiento reducido corresponden al tremor continuo registrado, asociado con la salida de gases y material piroclástico.

Eventos Destacables:

1.1.2 Actividad superficial

Columna Altura (Km)	Dirección	Pluma Distancia (Km)	Fuente información
0,3	NNE	50	Cámaras web Termas Puyehue y Futangue a las 07:30 HL Imagen Satelital Nasa: 13 Mar, Aqua(14:10 HL) .


Incandescencia: SI X NO ALTURA (Km) 0,3

1.1.3 Otras Observaciones:

2. Peligro

La zona de alto peligro representa el área altamente susceptible de ser afectada por piroclastos balísticos (3 km en torno al cráter y fragmentos ≥ 30 cm), por el avance de la lava, por flujos piroclásticos menores asociados a colapsos del frente de lava y por lahares secundarios. Estos últimos podrían ser generados por el represamiento de los cauces en las partes altas, principalmente en los ríos Nilahue y Contrafuerte o sus tributarios menores. A partir del análisis sistemático de imágenes satelitales, se estima que la lava ha alcanzado un área aproximada de 6,24 km² y un volumen de 0,26 km³ (superior a la lava de 1960 pero aún inferior a aquella de 1921-22). Hasta este momento, la lava ha rellenado parte de una depresión interna del distribuyéndose en varios lóbulos, uno de los cuales avanza hacia el noreste a través de un afluente del río Nilahue. Por otro lado, la zona de moderado peligro, representa aquellos sectores que podrían ser afectados por proyecciones balísticas (radio de 5 km) y lahares calientes o secundarios de volúmenes comparables a los observados durante la primera etapa de la erupción. Este escenario, de menor probabilidad relativa, pudiera verificarse con explosiones muy energéticas y/o una eventual acumulación de nieve o encuentro de la colada de lava con los cursos fluviales.

La zonificación presentada, orientada hacia la evaluación de los peligros proximales, no incluye las inundaciones o crecidas de los ríos como tampoco la removilización de material piroclástico cuya acumulación ocurre, principalmente, en los deltas de los ríos Nilahue en el lago Ranco y Golgol en el lago Puyehue. Asimismo, la actual fase eruptiva se caracteriza por una columna eruptiva débil, asociada a la emisión de ceniza fina y gases a una reducida tasa, cuyo efecto perceptible, dependiente de las condiciones meteorológicas, no se extiende más allá de 30 km del centro emisor generando, eventualmente, acumulaciones menores de espesores muy reducidos (milimétricos).



Exposición/Riesgo específico

En las zonas de peligro delimitadas en el mapa, los procesos descritos representan una amenaza para las personas, animales, vegetación e infraestructura. En la zona de alto peligro, esta amenaza es severa, mientras que en la zona de moderado peligro la amenaza es latente y se expresaría bajo condiciones más restringidas (menor probabilidad de ocurrencia). En las zonas distales no incluidas en la figura, y bajo condiciones meteorológicas desfavorables con viento este, localidades situadas al oeste del volcán podrían verse afectadas transitoriamente. La fracción fina de este material puede mantenerse en suspensión movilizándose a mayores distancias y afectando incluso las rutas aéreas que cruzan la Depresión Central. La removilización de material piroclástico hacia los deltas de los ríos Nilahue en el lago Ranco y Golgol en el lago Puyehue puede afectar la navegación e infraestructura lacustre a mediano y largo plazo.

3. Conclusión:

El análisis de la actividad sísmica revela que el proceso eruptivo del Cordón Caulle continúa, aunque con baja intensidad, y reducida emisión de material particulado. Las posibilidades de eventos explosivos menores aún permanecen, debido a posibles obstrucciones por la lava emitida y/o a cambios en la dinámica de la erupción.

Reporta: Jefe OVDAS FERNANDO GIL CRUZ Recepción: