

Reporte de Actividad Volcánica (RAV) N°14
Agosto de 2017
Región del Maule

El **Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) de Chile** da a conocer la siguiente información, obtenida a través de los equipos de monitoreo de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica (RNVV), procesados y analizados en el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (OVDAS):

A. Resumen de niveles de alerta volcánica.

De acuerdo con la evaluación de la actividad registrada durante el periodo indicado, los niveles de alerta para los volcanes de la región son los siguientes:

1. Complejo Volcánico Planchón - Peteroa.

Periodo evaluado: **1 al 15 de agosto.**

Se mantiene el nivel de alerta **AMARILLO.**

Observación: Se recomienda restringir acceso en radio de 1km en torno al cráter.

Nivel de alerta AMARILLO



B. Información detallada por volcán.

1. Complejo Volcánico Planchón - Peteroa:

- En la primera quincena se registraron cuarenta y dos (42) eventos relacionados con procesos de fracturamiento de material rígido denominados volcano-tectónicos (VT), con una magnitud local (M_L) máxima de 1,8. Las localizaciones de los sismos se concentraron principalmente bajo el edificio volcánico a profundidades entre 4 y 7 km. El sismo de mayor energía se localizó a 4 km en dirección norte (N) del cráter principal a una profundidad de 7 km.
- Con relación a los eventos relacionados a la dinámica de fluidos se clasificaron mil treinta y siete (1037) eventos sismos de largo periodo (LP) y catorce (14) señales tipo tremor (TR). Respecto a la sismicidad LP ésta registró magnitudes locales (M_L) menores a 1,3 y desplazamientos reducidos máximos (DR_C) de 2,5 cm². En cuanto a la sismicidad tipo Tremor los valores de desplazamiento reducido (DR_C) promedio fueron de 0,8 cm², valor considerado bajo, mientras que las frecuencias dominantes se conservaron entre 0,7 y 1,7 Hz principalmente.
- Las imágenes de la cámara IP han evidenciado la presencia de pequeñas desgasificaciones de baja energía y coloración blanquecina, cuyas alturas no superaron los 60 m sobre el nivel de los cráteres activos del Complejo.

-Ver **glosario** de palabras técnicas usadas en este reporte y significado de las **alertas** técnicas volcánicas en www.sernageomin.cl

- A partir de los datos obtenidos por dos (2) estaciones GNSS, que miden la deformación en el complejo volcánico, no se observaron variaciones significativas. Por otro lado, los datos entregados por un (1) Inclímetro electrónico, instalado en el complejo, tampoco muestra cambios relacionados con la actividad interna del volcán.
- No se reportaron anomalías en las emisiones de dióxido de azufre (SO₂) a la atmósfera en el sector próximo al complejo volcánico, según los datos obtenidos por The Ozone Monitoring Instrument (OMI) Sulfur Dioxide Group (<http://so2.gsfc.nasa.gov/>) y National Environmental Satellite, Data, and Information Service (NESDIS) (<http://satepsanone.nesdis.noaa.gov>).
- No se reportaron alertas térmicas en la zona asociada al complejo volcánico de acuerdo a los datos publicados por Middle InfraRed Observation of Volcanic Activity (MIROVA) en su sitio web (<http://www.mirovaweb.it/>), sistema de teledetección que indica cambios importantes en la temperatura de la superficie terrestre basado en los datos de Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS).

Aunque durante el periodo evaluado persiste la ocurrencia de una alta tasa de actividad sísmica, los niveles energéticos son comparativamente más bajos que los registrados durante los meses anteriores, continuando en niveles que superan su umbral base. Aunque el presente fenómeno tiene escasa expresión superficial y las medidas de deformación del edificio volcánico no muestran evidencias significativas asociadas con deformación interna, su dinámica sugiere el accionar de un sistema magmático profundo que aún no afecta el sistema hidrotermal superficial. Por lo tanto, no se descarta que el presente proceso pueda evolucionar conllevando a una interacción directa entre los dos sistemas, que pudiese impulsar actividad superficial de magnitud baja a moderada que afectaría las zonas de los cráteres activos. Por lo anterior se considera **zona de peligro aquella contenida en un radio de 1 km alrededor de la zona de cráteres activos recomendándose restringir el acceso a ella y se mantiene la alerta volcánica en:**

NIVEL AMARILLO: Cambios en el comportamiento de la actividad volcánica - *Tiempo probable para una erupción: SEMANAS/MESES.*

Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin)
Red Nacional de Vigilancia Volcánica (RNVV)
Observatorio Volcanológico de Los Andes del Sur (OVDAS)

Temuco, Chile.
18 de agosto de 2017

-Ver **glosario** de palabras técnicas usadas en este reporte y significado de las **alertas** técnicas volcánicas en www.sernageomin.cl