

## Reporte de Actividad Volcánica (RAV) Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur - Ovdas

<b>Región</b>	De Antofagasta		
<b>RAV N°</b>	30	<b>Fecha de emisión</b>	24 de febrero de 2023, 16:20 HL
<b>Periodo evaluado</b>	23 de febrero, 16:00 HL	<b>a</b>	24 de febrero, 15:00 HL
<b>Volcán</b>	Láscar	<b>GVP ID<sup>(1)</sup></b>	355100
<b>Alerta RAV anterior</b>	NARANJA	<b>Alerta Actual</b>	NARANJA
<b>1. Vigilancia Volcánica</b>			
<b>1.1 Actividad sísmica:</b>			
Durante las últimas 24 horas, el registro sísmico continúa mostrando actividad discreta tipo volcano-tectónica (VT, asociados con procesos de ruptura de material rocoso), como también sismos asociados a movimientos de fluidos de tipo Largo Periodo (LP) y Tornillos (TO) con un leve descenso en su recurrencia.			
<b>Tipo de sismo</b>	<b>No de sismos</b>	<b>M<sub>L</sub> máx. o D<sub>R</sub> máx.</b>	<b>Observaciones:</b> El sismo VT más energético fue localizado 0,7 km en dirección este sureste respecto del cráter activo, a una profundidad de 3,7 km. El sismo TO más energético ocurrió a las 01:30, hora local de hoy, y derivó en un REAV, que puede ser leído en <a href="https://rnvv.sernageomin.cl/volcan-lascar">https://rnvv.sernageomin.cl/volcan-lascar</a>
VT	35	M <sub>L</sub> = 0,7	
LP	6	D <sub>R</sub> = 9 cm <sup>2</sup>	
TR	1	D <sub>R</sub> = 2 cm <sup>2</sup>	
TO	4	D <sub>R</sub> = 70,3 cm <sup>2</sup>	
EX	-	-	
<b>1.2 Actividad superficial:</b>			
<b>Altura de columna máxima (km)</b>	<b>Dirección principal</b>	<b>Alcance de pluma (km)</b>	<b>Fuente de información</b>
0,38	Sureste	-	Cámara IP Ovdas
<b>Incandescencia nocturna (Sí/No)</b>	<b>Altura máxima (km)</b>	<b>Fuente de información</b>	
No	-	Cámara IP Ovdas	
<b>Observaciones:</b> Se observa desgasificación de baja intensidad, sin evidencias de material particulado.  El sismo TO más energético ocurrió a las 1:30, hora local de hoy, y derivó en un REAV, que puede ser leído en <a href="https://rnvv.sernageomin.cl/volcan-lascar">https://rnvv.sernageomin.cl/volcan-lascar</a>			
<b>1.3 Otras observaciones:</b>			
No se observa deformación mediante GNSS que indique variaciones de presión significativas en profundidad. La distancia entre estaciones mantiene variaciones inferiores a 1,5 cm, respecto al valor medio anual. El mayor desplazamiento horizontal se registra en la estación PUNA, al sur del cráter activo, a una tasa de 0,6 cm/mes, en dirección noroeste. Además, los desplazamientos verticales son bajos, observándose una tendencia negativa en la vertical de ambas estaciones a una tasa máxima de 0,5 cm/mes.			
No se ha logrado evaluar deformación mediante imágenes satelitales de radar, debido a la pérdida de coherencia producida por la nieve caída en el último periodo (última imagen Sentinel 1A: 19 de febrero).			
No se han detectado nuevas anomalías térmicas satelitales (fecha de última imagen: 24 de febrero <sup>(3)</sup> ).			
No se han detectado nuevas anomalías satelitales de SO <sub>2</sub> (fecha de última imagen: 23 de febrero <sup>(4)</sup> ).			
El dato más reciente para el flujo promedio de SO <sub>2</sub> es de 460 t/d para el día 21 de febrero. Las mediciones fueron hechas con un equipo DOAS.			
<b>2. Peligro</b>			
<b>Exposición / Riesgo específico (VER MAPA DE PELIGROS ANEXO)</b>			
Los potenciales impactos asociados a la presencia de un domo de lava al interior del cráter activo se derivan por su eventual destrucción total o parcial, a través de un evento de características explosivas. En este escenario, es esperable la ocurrencia de flujos piroclásticos y eyección de piroclastos balísticos dentro de la actual zona de peligros (ver mapa adjunto). No se descarta la afectación por caída de ceniza fuera del radio de zonificación, lo cual podría ocurrir, preferentemente, hacia el			

oeste. Lo anterior, como consecuencia de la dispersión predominante del viento durante los meses estivales, incluyendo mayoritariamente territorio nacional.

### 3. Conclusión

Continúa el proceso eruptivo del Volcán Lascar, caracterizado por la emisión de un domo anidado en el cráter principal, el cual se encuentra relativamente frío y desgasificado.


Los sismos más recurrentes son los de tipo volcanotectónico, mientras que los de tipo Largo Periodo y Tornillo acompañan el desarrollo efusivo vinculado con el cuerpo de lava tipo domo anidado en el cráter activo. La presencia de sismicidad con características especiales en su forma (atenuación y duración), tal como tipo Tornillo y VT, mezclados, comúnmente se asocian con taponamientos en los conductos.

En caso de originarse una desestabilización del domo, el escenario proyectado más esperable correspondería al proceso de destrucción, total o parcial, originándose eventos explosivos. En su desarrollo, este proceso podría generar un evento eruptivo mayor sin mostrar señales precursoras claras, cuyos productos más destructivos (flujos piroclásticos) podrían viajar a altas velocidades, siendo necesaria una respuesta rápida de las personas en las zonas expuestas hacia los sitios determinados de menor peligro. En primera instancia, la zona de potencial impacto de esta actividad podría alcanzar un radio de 10 km con centro en el cráter activo. Dado el actual proceso eruptivo, se recomienda considerar las zonas susceptibles de ser afectadas por procesos volcánicos intempestivos de acuerdo con el mapa adjunto (siguiente página).

- 
- (1) El GVP ID corresponde al número identificador del volcán en la base de datos del *Global Volcanism Program* perteneciente al *National Museum of Natural History* administrado por el *Smithsonian Institution*, disponible en <http://volcano.si.edu/>
- (2) El Desplazamiento Reducido (DR) es una medida de la longitud de desplazamiento de la onda sísmica independiente de la distancia del receptor a la fuente.
- (3) Sensor MODIS en MIROVA, Middle InfraRed Observation of Volcanic Activity (<http://www.mirovaweb.it/>)
- (4) Sitio: Monitoring Unrest From Space (<http://www.mounts-project.com/home>)
- \*Ver glosario de palabras técnicas utilizadas en este reporte y otros emitidos por el Ovdas en [sernageomin.cl](http://sernageomin.cl)



## Sernageomin - Red Nacional de Vigilancia Volcánica Mapa de Peligros Volcánicos - Febrero 2023 Volcán Láscar - Alerta Naranja



### Leyenda

- Cráter volcánico activo
- Zona de probable afectación por productos volcánicos correspondiente a un radio de 10 km respecto al centro del cráter activo.
- Radios de distancias referenciales respecto al cráter activo
- Ruta internacional
- Camino no pavimentado
- Camino pavimentado

Nota: no se descarta que material particulado fino pueda caer fuera del radio de afectación.

Última actualización: 24/02/2023 16:00